

Vorsorge- und Impfplan

| Vorsorgen | Zeitraum | Impfungen | Zusatzinfo |
|----------------|---------------------|--|---|
| U2 | 3.-10. Lebenstag | RSV-Immunsierung | In der Saison |
| U3 | 4.-5. Lebenswoche | | |
| Impfung | 2 Monate | 1. 6fach-Impfung 1. Pneumokokken 1. Meningokokken B 1. Rota (Schluckimpfung) | |
| U4* | 3.-4. Lebensmonat | 2. Rota (Schluckimpfung) | Min. 1 Monat nach 1. (Rota) Impfung |
| Impfung | 16-18 Wochen | 2. 6fach- Impfung 2. Pneumokokken 2. Meningokokken B | Min. 2 Monate nach 1. 6fach, Pneumokokken und Men B-Impfung |
| U5 | 6.-7. Lebensmonat | | |
| U6 | 11.-12. Lebensmonat | 1. M _{asern} M _{umps} R _{öteln} +V _{Windpocken} | |
| Impfung | 12-13 Monate | Meningokokken C 3. Meningokokken B | 1 Monat Abstand zum letzten Impftermin |
| Impfung | 13- 14 Monate | 3. 6fach-Impfung 3. Pneumokokken | 1 Monat Abstand zum letzten Impftermin |
| Impfung | 15 Monate | 2. MMRV | Mind. 1 Monat Abstand zum letzten Impftermin |
| Impfung | Ab 16 Monate | 1. FSME | 2. FSME 1-3 Monate später, 3. FSME 5-12 Monate nach der 2. FSME |
| U7 | 21.-24. Lebensmonat | | |
| U7a | 34.-36. Lebensmonat | | |
| U8 | 46.-48. Lebensmonat | | |
| U9 | 60.-64. Lebensmonat | Boostrix-Auffrischung FSME-Auffrischung | |
| U10 | 7-8 Jahre | | |
| U11 | 9-10 Jahre | Boostrix-Polio + HPV | |
| J1 | 13 - 14 Lebensjahr | Boostrix-Polio + HPV | Wenn vorher noch nicht erfolgt, Wenn HPV Impfung vor 15. Lebensjahr begonnen nur 2 Impfungen notwendig |
| J2 | 16-17 Jahre | | |

* Ggf erneute 6fach und Pneumokokken bei Frühgeborenen <37 SSW